

Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos

Fakta Donaxyl® (dekvaliniumklorid)¹

- Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos
- Lika effektivt som klindamycin vaginakräm (2 %)²
- Vaginaltablett som tas till kvällen i 6 dagar
- Lämpligt även för gravida/ammande
- Ingår i högkostnadsskyddet och kostar 185 kr per behandling

Donaxyl är en vaginaltablett som löser upp sig i slidan och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid. Behandlingen verkar lokalt och saknar systemeffekt.

Effekten av Donaxyl har jämförts med klindamycin vaginalkräm (2 %) i en enkelblind, randomiserad multicenterstudie (non inferiority).² Vänd på bladet och läs resultatet!


Ur TLV:s utvärdering av Donaxyl:³

"... fördelarna med minskad risk för antibiotika-resistens, ökad sortimentsbredd samt säkrare behandlingsalternativ till gravida kvinnor medför ett mervärde både för enskilda patienter och för samhället i stort."



Donaxyl är *minst lika* effektivt som klindamycin²

321 kvinnor som uppfyllde samtliga fyra Amsels kriterier fick antingen klindamycin vaginalkräm (2 %) i 7 dagar eller Donaxyl vaginaltablett i 6 dagar. Resultatet utvärderades 7 dagar och 25 dagar efter avslutad behandling.



Amsels kriterier:

- Typisk tunn, vitaktig flytning
- Positivt snifftest
- Förhöjt pH ($\geq 4,5$)
- Clue-celler i wet smear (mikroskopi)

Clinical cure rate:

Frånvaro av clue-celler och negativt resultat för ytterligare minst 2 av Amsels kriterier.

Resultat

- Donaxyl hade minst lika god effekt som klindamycin efter såväl 7 som 25 dagar
- Donaxyl var jämförbart med klindamycin efter 7 och 25 dagar på alla enskilda Amsels kriterier utom pH som var signifikant lägre med Donaxyl efter 7 dagar ($p=0,02$)

Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste problemen i båda grupperna var vaginalt obehag och klåda.

Säkerhet med Donaxyl

Donaxyl godkändes första gången 1993, är registrerat i 34 länder och har använts av cirka 8 miljoner kvinnor, varav 2 miljoner var gravida. Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % av användarna är flytningar, klåda och sveda samt svampinfektion. Donaxyl kan användas under hela graviditeten (klass A).¹

För fullständig information om Donaxyl, se produktmonografi och bipacksedel på Läkemedelsverkets hemsida.



Referenser: 1. Produktresumé Donaxyl. www.lakemedelsverket.se. 2. Weissenbacher et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73: 8-15. 3. www.tlv.se.

Donaxyl (dekvaliniumklorid) 10 mg/vaginaltablett. Indikation: Behandling av bakteriell vaginos. Förpackning: 6 tabletter. Rx, F. Dosering: 1 vaginaltablett dagligen i 6 dagar till kvällen. Farmakoterapeutisk grupp: Gynekologisk antibakteriell och antiseptisk kinolinderivat, G01A. Datum för översyn av produktresumé 2014-09-08. För mer information se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.

