



Warbixinta bukaanka

Bukaanada loo qoray Donaxyl[®] (dequalinium chloride) ee daaweynta jeermiska xubinta taranka

Waxaa lagu qoray Donaxyl, daawo aan antibiyootiga laheyn ee daaweynta jeermiska xubinta taranka.¹ Jeermiska xubinta taranka waa sababta ugu weyn dhacaanka urta ee haweenka.²

Aastaamaha jeermiska xubinta taranka

- Yar, dhacaan cad ee si xun u uro (sida kaluun qalalay)
- Cun cun yar iyo xannuun yar ayaa dhici kara
- Cabashada inta badan waxay dhacdaa galmada kadib ama la xiriirta caadada

WAA MAXAY JEERMISKA XUBINTA TARANKA?

Jeermiska xubinta taranka waa kala duwanaanta qeybta jeermiska xubinta taranka.

Xubinta taranka haweenka waxay wadataa bekteeriyaha dhalo ee ku abuurto aashito dabiici ah aaga xubinta taranka si looga hortago dhaawacyada. Heerka aashitada hoos ayay u dhacdaa iyo aaga waxay noqotaa mid hooseysa, jeermiska dhalo waxaa bedelo jeermisyo kale. Tani waxay kordhisaa halista jeermiska xubinta taranka. Jeermiska xubinta taranka ee sida joogtada ah uga dhacdo kadib dhiiga caadada ama galmo aan ilaalsaneyn sida labadaba dhiiga iyo shahwada ay u carqaladeyn karto aaga aashitada ee xubinta taranka.

Jeermiska xubinta taranka halis ma ahan, laakin waa in la daaweeyaa haddii ay sababto si aan ku habooneyn. Maxaa qaar ka mid ah haweenka ay u saameysaa iyo kuwa kale weli ma cado.

KANIINIGA XUBINTA TARANKA

Donaxyl[®]
dekvaliniumklorid

Tallooyinka looga hortagayo jeermiska xubinta taranka.

- Ka fogow nadaafada gaarka ee xad dhaafka, iyada oo la isticmaalayo saabuun xubinta tarankaaga iyo dhaqida gudaha xubinta tarankaaga.
- Isticmaal warqada musqusha ee horay ilaa gadaal" si looga hortaga faafinta jeermiska mandhiciirka ee galaya xubinta taranka.
- Isticmaal sarwaalada daboolo iyo ka bixi dabaal xerashada qoyan.
- Waxaa la doorbiday in la isticmaalo kondhom. Shahwada waa dhareer iyo waxay carqaladeyn kartaa aaga aashitada dabiiciga ah ee xubinta taranka. Iska ilaali kareemada dila shahwada iyo dareeraha

KANI WAA DONAXYL

Donaxyl waa daawo la dagaalameyso jeermiska xubinta taranka. Waa kaniiniga xubinta taranka ee sababo dhacaanka dabiiciga ah ee xubinta taranka iyo sii daayo waxyaabaha la dagaalamo jeermiska, isku darka daawada. Donaxyl waxaa kaliya ee ka shaqeysaa xubinta taranka iyo jirkana ma dhuuqo.

Sidaan waa sida ay daaweynta u shaqeysa

Qaado hal Donaxyl ee kaniiniga xubinta taranka ah ee maqribkii ilaa 6 maalmood. Geli kaniiniga xubinta taranka hoosta xubinta taranka marka aad saaxaneysid. Wadada ugu sahlan ee lagu sameeyo midaan waa in haddii aad ku seexatid luguhaagana kor ujeedisid.



Xasuuso

Donaxyl inta badan waxaa lagu yareyn karaa aastaamaha gudaha 1-3 maalmood, si kastaba, waa in aad sii joogteysaa daaweynta 6 maalmood. Haddii daweynta loo joojiyo si degdega cabashada dib ayay u dhici kartaa.

Xaqiiqooyinka uu hubiyay Barofoseer Emeritus Eva Rylander.

Tixraacyada: 1. Warqada warbixinta bukaanka Donaxyl. www.fass.se 2. Jeermiska xubinta taranka. www.internetmedicin.se

Donaxyl (dequalinium chloride) kaniiniga 10 mg/vaginal. **Tilmaamaha:** Daaweynta jeermiska xubinta taranka. **Baakid:** 6 kaniini. Rx, F. **Goojada:** 1 kaniini xubinta taranka maaliinta oo 6 maalmood maqrib walba. **Kooxda daaweynta kaniiniyada:** Daaweynta xubinta taranka ka hortaga caabuqa iyo antiseptic quinoline derivate, G01A. Taariiqda dib u eegida ee hordhaca badeecada 8/9/2014. Wixii warbixin dheeraad ah fiiri www.fass.se ama la xiriir CampusPharma AB, www.campuspharma.se.

NIYADA KU HAAY MARKA AAD QAADANEYSID DONAXYL

- Qaar kamid ah isku darada ee kaniiniga xubinta taranka gabi ahaanba ma qalajiso xubinta taranka, laakin laga yaabo in ay soo raacaan kastuumadaada. Tani ma yareyso saameynta daaweynta, mana bedesho kastuumadaada.
- Haddii caadadaada ay si isku mar ah u timaado adiga oo qaadanayo Donaxyl, soo dhaxgasho daaweynta inta lagu jiro maalmaha aad dhiigbaxeysid inta uga badan. Kadib jooji daaweynta markale.
- Ka fogow u isticmaalka saabuunta xubinta tarankaaga iyo ku dhaqida gudaha xubinta taranka adiga oo isticmaalayo Donaxyl.
- Ka fogow galmada inta lagu jiro daaweynta. Isticmaal kondhomka latex ama wado kale oo ugu yaraan ah 12 saacadood daaweynta kadib sida Donaxyl ay u saameyn karto kondhomka iyo caagaga kale ee la sameeyay aanka aheyn kondhomka.

Uurka iyo naasnuujinta

Donaxyl waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro uurka iyo marka la naasnuujinayo.

MA JIRAAN SAAMEYN DHINACYADA AH?

Sida daawooyinka oo dhan, Donaxyl waxay sababi kartaa saameynada dhinaca, laakin ma ahan dacwadaha oo dhan.

Saameynta dhinaca badanaa ee ka dhici kara sida la xiriirto daaweynta Donaxyl waa maxaliga, qafiid ah iyo muddo gaaban nool. Bilowga daaweynta, aastaamaha waxay mararka qaar noqon karaan mid xun ka hor inta aysan wanaagsanaan. Joogteynta qaadashaa Donaxyl, laakin haddii dhibaataada ay sii jirto daaweynta kadib waa in aad la xiriirtaa dhaqtarkaaga sida ugu dhaqsaha badan ee suurtaglka ah.

Saameynta guud ee ka dhici karta 1-10% ee isticmaalayaasha waa dhacaanka, cuncunka ama xannuunka jirka, iyo caabuqa jeermiska xubinta taranka (cabeebka).

Wixii warbixin dhameystiran ee ku saabsan Donaxyl, fiiri warbixinta bukaannada ee baakid ku jirto.

