



Patientinformation

Donaxyl® (dekvaliniumklorid)
för behandling av bakteriell vaginos



Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos är den vanligaste orsaken till illaluktande flytningar hos kvinnor.¹

Donaxyl är ett antibiotikafritt läkemedel för behandling av bakteriell vaginos. Läs vidare i broschyren så får du veta mer om hur Donaxyl kan hjälpa dig.²

Symtom vid bakteriell vaginos

- En tunn, vit flytning som luktar illa (som skämd fisk)
- Lätt klåda och sveda kan förekomma
- Besvären kommer ofta efter samlag eller vid mens

Vad är bakteriell vaginos?

Bakteriell vaginos är en obalans i slidans bakterieflora.

I underlivet finns laktobaciller som skapar en naturligt sur miljö i slidan och skyddar mot infektioner. Om surhetsgraden minskar och miljön blir basisk kan laktobacillerna trängas undan av andra bakterier. Då ökar risken för bakteriell vaginos. Besvären vid bakteriell vaginos kommer ofta efter mens eller oskyddat samlag eftersom både blod och sperma kan störa den sura miljön i slidan.

Bakteriell vaginos är inte farligt, men bör behandlas om det ger besvär. Varför vissa kvinnor drabbas och inte andra är fortfarande oklart.

A close-up photograph of a pink flower, likely a gerbera, with numerous water droplets on its petals. The flower is the central focus, with its green stem visible at the bottom. The background is a soft, out-of-focus pink.

Tips för att undvika bakteriell vaginos

- Undvik överdriven intimhygien, att använda tvål i underlivet och att tvätta dig inuti slidan.
- Använd toalettpapper "framifrån och bak" för att inte sprida tarmbakterier till slidan.
- Använd luftiga underkläder och ta av dig våta badkläder.
- Använd gärna kondom. Sperma är basiskt och kan störa den naturligt sura miljön i slidan. Undvik spermiedödande krämer och gel.

Detta är Donaxyl

Donaxyl är ett läkemedel mot bakteriell vaginos. Det är en vaginaltablett som löser upp sig i slidans naturliga fukt och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid. Donaxyl är endast verksamt i slidan och tas inte upp av kroppen.

Så går behandlingen till

Ta en Donaxyl vaginaltablett till kvällen i 6 dagar. För in vaginaltablett djupt i slidan när du går och lägger dig. Detta görs enklast om du ligger med benen lätt uppdragna.



Kom ihåg

Ofta lindrar Donaxyl symtomen redan inom 1-3 dygn, men du ska fortsätta behandlingen i 6 dagar. Om behandlingen avslutas i förtid kan besvären återkomma.

Att tänka på när du tar Donaxyl

- Vissa ingredienser i vaginaltablettens löser inte upp sig helt i slidan, utan kan hamna i underkläder. Detta påverkar inte behandlingens effekt och missfärgar inte dina underkläder.
- Om mensens inträffar samtidigt som du tar Donaxyl, gör en behandlingspaus under de dagar du blöder som mest. Återuppta sedan behandlingen.
- Undvik att använda tvål i underlivet och att tvätta dig inuti slidan samtidigt som du tar Donaxyl.
- Undvik oskyddat samlag under behandlingen. Donaxyl kan påverka kondomer och pessarer av annat material än latex. Använd latexkondom eller någon alternativ preventivmetod under minst 12 timmar efter behandlingen.

- Använd inte Donaxyl om du är allergisk mot dekvalinuimklorid eller något annat innehållsämne i vaginaltablett.



Finns det biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Donaxyl orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.

De flesta biverkningar som kan förekomma vid behandling med Donaxyl är lokala, milda och kortvariga. I början av behandlingen kan symtomen ibland förvärras innan de förbättras. Fortsätt ta Donaxyl, men om besvären kvarstår efter behandlingen bör du snarast kontakta din läkare.

Vanliga biverkningar som kan förekomma hos 1–10 % av användarna är flytningar, klåda eller sveda och vaginal svampinfektion.

Plats för egna anteckningar:

**För fullständig information om Donaxyl,
se patientinformationen i förpackningen.**



Faktagranskad av *professor emeritus Eva Rylander*.

Referenser: 1. Bakteriell vaginos. www.internetmedicin.se
2. Bipacksedel Donaxyl, www.fass.se

Donaxyl (dekvaliniumklorid) 10 mg vaginaltabletter är ett receptfritt läkemedel för behandling av bakteriell vaginos. Donaxyl ska inte användas inom 12 timmar före förlossning. Rådfråga läkare innan läkemedlet används och läs bipacksedeln noga före användning. CampusPharma AB, www.campuspharma.se.



Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg
Tel. 031-20 50 20 | info@campuspharma.se
www.campuspharma.se