




Till dig som ska behandlas med Donaxyl mot bakteriell vaginos

Så här tar du Donaxyl:

Donaxyl är en **vaginaltablett** som du för djupt in i slidan som en tampong. Ofta lindrar Donaxyl symtomen redan inom 1–3 dygn, men du ska fortsätta behandlingen i **6 dagar**. Ytterligare anvisningar finns i förpackningen.

Tänk på att:

- **Ta hela behandlingen** även om du inte längre upplever några symtom. Om behandlingen avslutas i förtid kan besvären komma tillbaka.
- **Effekten försämras** om du tvättar underlivet med tvål/intimtval.
- **Undvik vaginala samlag** – det är bra om slemhinnorna får vila.
- **Om mensen inträffar** samtidigt som du tar Donaxyl, pausa behandlingen de dagar du blöder som mest, och återuppta den därefter.



Vaginaltablett = en tablett som förs in i slidan

Donaxyl®

dekvaliniumklorid



Tänk på det här!

.....

.....

.....

Så här använder du Donaxyl:



1

Tvätta händerna
innan du öppnar
blisterförpackningen.




2

Ligg ner
med benen lätt
uppdagna.



3

För in
vaginaltablettens
djupt i slidan.



Vaginan är självrengörande

Undvik att tvätta
underlivet med tvål eller
vaginaldusch. Tvätta
med ljummet vatten
och/eller oparfymrad
olja max en gång om
dagen. Du kan även
smörja med neutral
mjukgörande kräm om
det känns torrt.

Hur ska
det lukta
egentligen?

De vanligaste
symtomen?

Vad är
bakteriell
vaginosa?



Fler frågor och svar på **donaxyl.se**

Donaxyl (dekvaliniumklorid) vaginaltabletter är ett receptfritt läkemedel för behandling av bakteriell vaginosa hos kvinnor mellan 18 och 55 år. Doseringen är en vaginaltablett dagligen i sex dagar. Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan symtomen återkomma. Donaxyl skall inte användas inom 12 timmar före förlossning. Diagnosen ska första gången vara konstaterad av läkare. Rådfråga läkare om symtom kvarstår eller återkommer efter avslutad behandling. Om du planerar att bli gravid, är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller barnmorska innan du använder Donaxyl. Texten är baserad på bipacksedel godkänd 2022-06-27. Läs bipacksedeln noga före användning. CampusPharma AB, www.campuspharma.se (C3815-3 2024-02 SE)



Karl Gustavsgatan 1A | 411 25 Göteborg | Tel: 031-20 50 20 | info@campuspharma.se | campuspharma.se