

Enda receptfria läkemedlet mot bakteriell vaginos!



Behandlar bakteriell vaginos • Antibiotikafritt läkemedel • Vaginaltablett

Finns på ditt apotek eller nätapotek. Läs mer på donaxyl.se



Vad är bakteriell vaginos?

Underlivet skyddas av laktobaciller som finns där helt naturligt. De skapar en sur miljö som skyddar mot infektioner. Vid bakteriell vaginos har det blivit obalans i underlivet och laktobacillerna har trängts undan av andra bakterier. Du kan märka detta genom att dina flytningar blir mer gråvita och får en fiskliknande lukt. Lukten blir mer markant efter mens eller samlag.

Vad är Donaxyl?

Donaxyl är ett receptfritt läkemedel mot bakteriell vaginos. Det är en vaginaltablett som löser upp sig i slidans naturliga fukt och frisätter den bakteriedödande substansen dekvaliniumklorid.

Hur ska Donaxyl tas?

En vaginaltablett tas till kvällen i 6 dagar. Vaginaltablettens förs in djupt in i slidan vid sänggående och verkar när du sover. Det är viktigt att fullfölja hela kuren. Ofta lindrar Donaxyl symtomen redan inom 1–3 dygn, men du ska fortsätta behandlingen i 6 dagar. Om behandlingen avslutas i förtid kan besvären komma tillbaka. Ytterligare anvisningar finns i förpackningen.

Donaxyl (dekvaliniumklorid) vaginaltabletter är ett receptfritt läkemedel för behandling av bakteriell vaginos hos kvinnor mellan 18 och 55 år. Doseringen är en vaginaltablett dagligen i sex dagar. Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan symtomen återkomma. Donaxyl skall inte användas inom 12 timmar före förlossning. Diagnosen ska första gången vara konstaterad av läkare. Rådfråga läkare om symtom kvarstår eller återkommer efter avslutad behandling. Om du planerar att bli gravid, är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller barnmorska innan du använder Donaxyl. Texten är baserad på bipacksedel godkänd 2022-06-27. Läs bipacksedeln noga före användning. CampusPharma AB, www.campuspharma.se

Tips under behandling:

- Undvik användning av tvål, spermiedödande medel och vaginaldusch.
- Undvik att ha vaginalt samlag.
- Om mens inträffar samtidigt som du tar Donaxyl, pausa behandlingen de dagar du blöder som mest, och återuppta den därefter.
- Fullfölj hela behandlingen även om symtomen är borta.

