

สำหรับผู้ใช้

Amorest 28®

(norgestimate + ethinylestradiol)



นี่คือ Amorest 28

Amorest 28 คือยาคุมกำเนิด ซึ่งช่วยป้องกันคุณจากการตั้งครรภ์ ขอ
เสนอวิธีใช้ที่ถูกต้อง Amorest 28 มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า ยาเม็ดคุมกำเนิด
ชนิดฮอร์โมนรวม เพราะประกอบด้วยฮอร์โมนสองชนิด คือ เอสโตรเจน
(ethinylestradiol) และโปรเจสโตเจน (norgestimate)

Amorest 28 ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดังนี้ :

- ไม่เกิดการตกไข่
- เยื่อบุมดลูกจะบางลงและไม่มีการหลุดลอกออก ซึ่งจะไม่สามารถฝังตัวได้
- สารคัดหลั่งที่คอกมดลูกหนาขึ้น ทำให้สเปิร์มไม่สามารถทะลุเข้าไปได้

ก่อนรับประทานยา Amorest 28 :

- อ่านใบแทรกในบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด
- หากมีคำถามใด ๆ กรุณาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

รอบประจำเดือนปกติของคุณ

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Amorest 28 สิ่งที่สำคัญก็คือ คุณจะต้องทราบ
ว่ารอบประจำเดือนปกติของคุณเป็นอย่างไร ไม่ควรปล่อยให้รอบประจำเดือน
เลื่อนมาเรื่อยๆ เยื่อบุมดลูกจะเตรียมตัวเพื่อรับไข่ โดยเลือดจะไหลออกมามาก
และแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับไข่ในกรณีที่เกิดการปฏิสนธิ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
การตั้งครรภ์ให้เติบโต ถ้าไข่ไม่ปฏิสนธิ ก็จะหลุดออกมาพร้อมกับเยื่อบุมดลูกที่ก่อตัว
ใหม่ในรังไข่หลังจากผ่านไป 14 วัน เลือดที่ไหลออกมานี้เรียกว่า ประจำเดือน
ปกติแล้ว ประจำเดือนจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 3-8 วัน รอบประจำเดือนทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มมีเลือดไหลจนมีเลือดไหลอีกครั้ง โดยทั่วไปอยู่ที่ 28 วัน แต่จะขึ้นอยู่กับ
ผู้หญิงแต่ละคน ซึ่งอาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 ถึง 35 วัน การตกไข่จะเกิด
ขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 20 ในรอบ 28 วัน

ผลของยาเม็ดคุมกำเนิด

เมื่อคุณใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม รอบประจำเดือนจะลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับรอบประจำเดือนปกติของคุณ อาการปวดประจำเดือนและ
อาการปวดท้องน้อยเนื่องจากการตกไข่จะลดลงเช่นกัน สารคัดหลั่งที่หนาขึ้น
ที่คอกมดลูกจะทำให้แบคทีเรียผ่านเข้าไปได้ยากขึ้น ผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
มีโอกาสเกิดอาการปีกมดลูกอักเสบน้อยกว่า ในทางกลับกัน ยาเม็ดคุมกำเนิด
ไม่ได้ป้องกันโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ :

ยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ป้องกันโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น
คุณจึงควรใช้ถุงยางอนามัยเป็นมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเมื่อ
เปลี่ยนคู่นอน

บรรจุภัณฑ์ของ Amorest 28 ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์แบบแผง 3, 6 หรือ
13 แผง แผงละ 28 เม็ด ยาเม็ดสีน้ำเงิน 21 เม็ดแรก (แถวที่ 1-3) มีฮอร์โมน
ส่วนยาเม็ดสีขาว 7 เม็ด (แถวที่ 4) จะไม่มีฮอร์โมน



วิธีใช้ Amorest 28

- เริ่มรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงินเม็ดแรกที่ทำเครื่องหมายเริ่มต้น ซึ่งอยู่ในแถว
บนสุด
- ถ้าคุณรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงินเม็ดแรกในวันแรกของรอบประจำเดือน
คุณจะได้รับ การป้องกันจากการตั้งครรภ์ทันที หรือคุณจะเริ่มรับประทานยา
Amorest 28 ในวันที่ 2-5 ของรอบประจำเดือนก็ได้ แต่คุณต้องใช้วิธีการ
คุมกำเนิดเพิ่มเติม (เช่น ถุงยางอนามัย) สำหรับ 7 วันแรก
- คุณควรรับประทานยาเม็ดกับของเหลวปริมาณเล็กน้อยในเวลาใกล้เคียง
กันทุกวัน
- แผงยาแต่ละแผงจะมีแถบขาวที่ทำเครื่องหมายวันของสัปดาห์อยู่ แถบขาว
แต่ละอันมีแถบ 7 อันที่แสดงวันของสัปดาห์ เลือกแถบที่เริ่มต้นด้วยวันของ
สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่คุณเริ่มรับประทานยา ติดแถบนั้นที่ส่วนบนสุดของ
แผงยา
- รับประทานยาตามลูกศรจนหมดทั้ง 28 เม็ด โดยส่วนใหญ่ คุณจะมีเลือด
ออกในรอบประจำเดือน (ประจำเดือนมา) 2-3 วันหลังจากรับประทานยาเม็ด
สีน้ำเงินที่มีฮอร์โมนเม็ดสุดท้าย
- ในวันรุ่งขึ้น หลังจากวันที่รับประทานยาหมดแผง ให้เริ่มรับประทานยาแผง
ใหม่ได้ทันที ถึงแม้คุณจะมีประจำเดือนก็ตาม ซึ่งหมายความว่า คุณจะ
เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ในวันเดียวกันของสัปดาห์ และคุณจะมีเลือดออก
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการรับประทานยาตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่
28 ในตัวอย่าง วันแรกของรอบประจำเดือนคือวันพฤหัสบดี

1. เริ่มโดยการรับประทานยาเม็ดแรกในวันแรกที่ประจำเดือนมา เช่น ถ้าเป็น
วันพฤหัสบดี ให้เลือกแถบขาวที่เริ่มต้นด้วย "To" ติดแถบขาวที่แสดงวัน
ของสัปดาห์ที่ด้านบนของแผงยา ตรงที่เขียนว่า "ติดแถบที่แสดงวันของ
สัปดาห์ที่นี่"
2. รับประทานยาวันละหนึ่งเม็ด จนกระทั่งหมดแผง
3. เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ทันที

ติดแถบที่แสดงวันของสัปดาห์ที่นี่

เช่น ถ้าวันแรกที่ประจำเดือนมาคือวัน
พฤหัสบดี ให้ติดแถบที่แสดงวันของ
สัปดาห์ที่เริ่มต้นด้วย "To" ที่ด้านบน
ของแผงยา เริ่มรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงิน
เม็ดแรกของแถวบนสุดเสมอ



อ่านวิธีเริ่มรับประทาน Amorest 28 หลังจากการคลอดบุตรหรือในกรณีที่เคย
ใช้ยาคุมกำเนิดประเภทฮอร์โมนอื่นมาก่อนเพิ่มเติมได้ในใบแทรก

คำถาม ที่พบบ่อย

ฉันควรทำอย่างไรถ้าลืมรับประทาน Amorest 28

ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์จะสูงสุดเมื่อคุณลืมรับประทานยาเม็ดในช่วงปลอดฮอร์โมน นั่นก็คือ เมื่อมีช่วงปลอดฮอร์โมนยาวนานกว่า 7 วัน

- ถ้าคุณลืมรับประทานยาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ควรรับประทานยา คุณจะยังคงมีการป้องกันจากการตั้งครรภ์อยู่ รับประทานยาทันทีที่นึกได้แล้วรับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ
- ถ้าคุณลืมรับประทานยามากกว่า 12 ชั่วโมง ผลของยาเม็ดคุมกำเนิดอาจลดลง ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ :

ถ้าคุณลืมรับประทานยาในแผงมากกว่า 1 เม็ด :
ติดต่อขอคำแนะนำจากแพทย์ / พยาบาลผดุงครรภ์

ลืมรับประทานยา 1 เม็ดในสัปดาห์ที่ 1 :
รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องรับประทานยาละสองเม็ดก็ตาม รับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ แต่อย่าลืมใช้วิธีการคุมกำเนิดเพิ่มเติม (เช่น ถุงยางอนามัย) ไปอีก 7 วัน ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาห์ก่อนที่จะลืมรับประทานยา ก็มีความเสี่ยงที่คุณจะตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทย์ / พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณทันที

ลืมรับประทานยา 1 เม็ดในสัปดาห์ที่ 2 :
รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องรับประทานยาละสองเม็ดก็ตาม รับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ ยาเม็ดคุมกำเนิดยังมีผลตามต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ถ้าคุณลืมรับประทานยามากกว่า 1 เม็ด คุณจะต้องใช้การคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วัน

ลืมรับประทานยา 1 เม็ดในสัปดาห์ที่ 3 :
ถ้าคุณเลือกใช้วิธีการหนึ่งจากสองตัวเลือกต่อไปนี้ คุณจะไม่ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย :

1. รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ ถึงแม้ว่าคุณจะต้องรับประทานยาละสองเม็ดก็ตาม รับประทานยาเม็ดที่เหลือตามเวลาปกติ ข้ามยาเม็ดสัปดาห์ที่ 7 เม็ด แล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่แผงต่อไปทันที คุณอาจไม่มีเลือดประจำเดือนจริง ๆ จนกระทั่งช่วงท้ายของยาแผงที่สอง อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบหยดเลือดและเลือดประจำเดือนออกมาจนต้องใช้ผ้าอนามัยในบางวันที่คุณรับประทานยา
2. หยุดรับประทานยาเม็ดที่มีฮอร์โมนในแถวที่ 3 กันที แล้วเริ่มรับประทานยาเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมน (เม็ดสีขาว) ในแถวสุดท้าย จากนั้นเริ่มรับประทานยาแผงใหม่

ลืมรับประทานยา 1 เม็ดในสัปดาห์ที่ 4 :
การลืมรับประทานยาเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนเม็ดสีขาวไม่มีผลกระทบต่อคุมกำเนิด ทั้งยาเม็ดสีขาวที่ลืมรับประทาน แล้วรับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ

หมายเหตุ : ถ้าคุณลืมรับประทานยาจากแผงแต่ไม่มีอาการเลือดออกหลังจากหยุดยาในช่วงที่รับประทานยาเม็ดสีขาวที่ไม่มีฮอร์โมน คุณอาจตั้งครรภ์ปรึกษาแพทย์ / พยาบาลผดุงครรภ์ก่อนเริ่มรับประทานยาแผงต่อไป

ฉันจะทำไมถ้าต้องการเปลี่ยนวันเริ่มต้นรอบประจำเดือนของฉัน

อย่ารับประทานยาทั้งหมดในแถวที่ 4 ก่อนเริ่มต้นรับประทานยาแผงต่อไป ตัวอย่าง ถ้าโดยปกติ คุณเริ่มมีเลือดประจำเดือนในวันศุกร์ และคุณต้องการให้เริ่มมาในวันอังคาร ให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่เร็วกว่าปกติ 3 วัน เริ่มรับประทานยาเม็ดสีขาวเม็ดแรกของแถวบนสุด ทั้งยาแผงแรกที่เหลือ

จะทำไมถ้าฉันต้องการให้ประจำเดือนมาช้าลง

เมื่อคุณรับประทานยาเม็ดสุดท้ายของแถวที่ 3 แล้ว คุณสามารถทำให้ประจำเดือนมาช้าลงได้โดยข้ามยาเม็ดสีขาวที่ไม่มีฮอร์โมนไปเริ่มรับประทานยาเม็ดแถวที่ 1 ของยาแผงใหม่ได้ทันที รับประทานยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเม็ดสีขาวเช่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการมีประจำเดือน หลังจากนั้น รับประทานยาเม็ดสีขาว 7 วัน แล้วเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ที่มี 28 เม็ดในวันเริ่มต้นใหม่ได้เลย

ฉันจะทำไมถ้ามีประจำเดือนมาเล็กน้อย

อาจมีประจำเดือนมาเล็กน้อย ซึ่งพบได้บ่อยเมื่อคุณเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ความเสี่ยงที่จะเกิดประจำเดือนผิดปกติจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณไม่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นประจำ หรือเมื่อคุณรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานานมาก ๆ ถ้าการมีประจำเดือนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัว หรือประจำเดือนมาหลังจากหลายเดือน ให้ติดต่อพยาบาลผดุงครรภ์ / แพทย์ของคุณ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าอาเจียนหรือท้องร่วง

ถ้าคุณอาเจียนภายใน 3-4 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ดสีขาวและ / หรือท้องร่วงอย่างรุนแรง อาจเป็นไปได้ว่าร่างกายของคุณไม่สามารถดูดซึมฮอร์โมนได้อย่างถูกต้อง หลังจากอาเจียนหรือท้องร่วง คุณจะต้องรับประทานยาเม็ดสีขาวจากแผงอื่น (แผงสำรอง) แทนที่ ถ้าทำไม่ได้ หรือผ่านเวลาที่คุณรับประทานยาตามปกติไปแล้ว 12 ชั่วโมง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “ฉันจะทำไมถ้าลืมรับประทานยา”

ฉันจะทำไมถ้ารับประทานยาอื่นอยู่

แจ้งพยาบาลผดุงครรภ์หรือแพทย์ของคุณ ถ้าคุณรับประทานยาอื่นอยู่ด้วยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกับยาอื่น ๆ อาจทำให้การป้องกันลดลงได้ ตัวอย่าง ยาปฏิชีวนะบางตัว ยารักษาโรคลมบ้าหมู ยาต้านกัมมันต์ และสมุนไพรเช่น จอห์นเวิร์ต เสี่ยงต่อการรบกวนการฟรุ้งฟร้ง เนื่องจากสามารถล้างผลของยาเม็ดคุมกำเนิดได้

ฉันจะทำไมถ้าต้องการตั้งครรภ์

ถ้าคุณต้องการตั้งครรภ์ คุณจะต้องรับประทานยาแผงที่กำลังรับประทานอยู่ให้หมด แต่ไม่ต้องเริ่มรับประทานแผงใหม่ในผู้หญิงส่วนใหญ่ การตกไข่จะเริ่มอีกครั้งเมื่อหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด แต่ในบางคนที่ต้องใช้เวลานานขึ้นอยู่กับการตั้งครรภ์ของรังไข่เอง อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงทุกคนที่ต้องการตั้งครรภ์จะต้องหลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารเสริมกรดโฟลิก เช่น Natalben Gravid (อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าต่อไป)

ผลข้างเคียงใดบ้างที่ฉันอาจได้รับ

ผลข้างเคียงโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง เวียนศีรษะ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ ประจำเดือนมามาก หรืออารมณ์แปรปรวน ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะไม่มีรุนแรง และจะหายไปเองในไม่กี่เดือน มีผลข้างเคียงบางอย่างที่รุนแรง แต่พบได้ยาก จากผลข้างเคียงเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงสูงกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะในปีแรก หรือเมื่อใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมหลังจากหยุดรับประทานยานานเกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดจะเพิ่มขึ้น ถ้าคุณรับการผ่าตัดใหญ่ หรือเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ในกรณีนี้ คุณควรหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

ต้นตอและติดต่อแพทย์ทันที ถ้าคุณพบอาการใด ๆ ต่อไปนี้ :
อาการบวมหรือเจ็บบ่งชี้ถึงภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงของบริเวณขาหนีบ (เช่น ชัดแดง หรือเขียว) การเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น การปวดศีรษะที่คล้ายคลึงกับไมเกรนที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อน เจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบาก เจ็บช่วงท้องอย่างรุนแรง เวียนศีรษะหรือเสียสมดุล คื่นอย่างรุนแรงหรือเป็นผื่นคัน

คำถาม ที่พบบ่อย

สิ่งสำคัญที่ควรจำ :

ถ้าคุณประสบผลข้างเคียงใด ๆ โดยเฉพาะอาการที่รุนแรงหรือยาวนาน หรือสุขภาพของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง และคุณคิดว่า Amorest 28 อาจเป็นสาเหตุ ให้ติดต่อแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาพยาบาล
ผดุงครรภ์หรือแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ใบแทรกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในบรรจุภัณฑ์

ฉันจะอย่างไรถ้าต้องการตั้งครรภ์

คำแนะนำโดยทั่วไปคือ คุณสามารถรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีช่วงพัก แต่ก็ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะเจาะจงสำหรับ Amorest 28 ไม่มีการคุมกำเนิดใด ๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่าไม่มีประจำเดือนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงินที่มีฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงพัก การมีประจำเดือนของคุณอาจน้อยลง คุณสามารถรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องได้จนกระทั่งมีประจำเดือน (ประจำเดือนมานาน) ให้หยุดรับประทานยาไม่เกิน 7 วัน แล้วเริ่มรับประทานยาเม็ดสีน้ำเงินที่มีฮอร์โมนอีกครั้ง

เริ่มรับประทานกรดโฟลิก เมื่อคุณหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดและต้องการตั้งครรภ์

กรดโฟลิกจำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ตามปกติและการพัฒนาสมองและระบบประสาทของการกในครรภ์ หากได้รับกรดโฟลิกไม่เพียงพอ อาจเพิ่มความเสี่ยงที่การจะเกิดความบกพร่องของกระดูกไขสันหลังได้ สำนักงานอาหารแห่งชาติสวีเดน (The Swedish National Food Administration) และ คณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งชาติ (National Board of Health and Welfare) แนะนำให้รับประทานกรดโฟลิกเสริม 400 ไมโครกรัมต่อวัน เพื่อให้ได้รับผลอย่างถูกต้อง ควรเริ่มรับประทานประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์

Natalben Gravid คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนว่าจะตั้งครรภ์ Natalben Gravid ประกอบด้วยกรดโฟลิกที่ออกฤทธิ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้หญิง และเหล็ก ไอโอดีน วิตามิน D โอเมกา 3 และสารอาหารอื่น ๆ อีก 14 ชนิดที่คิดสรรแล้วว่าเหมาะสมกับสตรีมีครรภ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถแทนที่อาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนได้ แต่ต้องรับประทานอาหารอย่างหลากหลายและสมดุล และมีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

ปรึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณ หรืออ่านเพิ่มเติมที่ www.natalben.se

Amorest 28 (norgestimate 250 ไมโครกรัม, ethinylestradiol 35 ไมโครกรัม), ชนิดเม็ด, ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม Rx. F. ATC code G03AA11.

ข้อบ่งใช้ : ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง

คำเตือนและข้อห้าม : ต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของผู้หญิงแต่ละคนเมื่อเลือกสั่งยา Amorest 28 หรือไม่ โดยเฉพาะภาวะเส้นเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ (VTE) ที่เกิดจาก Amorest 28 เมื่อเปรียบเทียบกับยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมตัวอื่น

บรรจุภัณฑ์ : 3x28, 6x28 และ 13x28 แผงละ 28 เม็ด แต่ละแผงประกอบด้วยยาเม็ดสีน้ำเงินที่มีฮอร์โมน 21 เม็ด และยาหลอกเม็ดสีขาว 7 เม็ด
ปรับปรุงสรุปผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.fass.se www.campuspharma.se

