

راهنمای مصرف کنندگان

Vinelle

(دزوژسترول)

نحوه استفاده از Vinelle

- اگر اولین قرص را در اولین روز قاعده‌گی خود مصرف کنید، از روز اول در برابر بارداری محافظت خواهید شد. شما همچنین می‌توانید مصرف Vinelle را از روز 2 تا 5 چرخه قاعده‌گی خود شروع کنید، اما در این صورت در 7 روز اول، باید از یک روش پیشگیری دیگر (مانند کاندوم) استفاده کنید.
- اگر می‌خواهید مصرف Vinelle را پس از زایمان شروع کنید یا اینکه روش پیشگیری را از یک روش هورمونی دیگر به Vinelle تغییر دهید، بروشور داخل بسته را مطالعه کنید.
- به منظور محافظت کامل در برابر بارداری، باید هر روز قرص‌ها را به طور منظم و تقریباً در یک ساعت خاص مصرف کنید. قرص را با کم مایعات مصرف کنید.
- بر روی بسته قرص، فلش‌هایی بین قرص‌ها چاپ شده است. در قسمت پشت، روزهای هفته روی فویل چاپ شده است. هر قرص مربوط به یک روز از هفته است.



به عنوان مثال، اگر از روز چهارشنبه شروع کنید، باید از قرصی شروع کنید که با علامت "O/K" مشخص شده است.

- هر بار که یک بسته قرص جدید را شروع می‌کنید، باید یک قرص از ردیف بالا مصرف کنید. برای مثال، اگر از روز چهارشنبه شروع کنید، باید قرصی را که با علامت چهارشنبه مشخص شده (دارای علامت "O/K" روی بسته قرص) مصرف کنید.
- به قرص روزانه قرص‌ها ادامه دهید تا زمانی که بسته خالی شود و همیشه به جهت فلش‌ها توجه داشته باشید. با بررسی قسمت پشت بسته، همیشه می‌توانید ببینید که آیا قرص مربوط به آن روز را مصرف کرده‌اید یا خیر.
- ممکن است هنگام استفاده از Vinelle خونریزی داشته باشید اما باید به صورت عادی به مصرف قرص‌ها ادامه دهید.
- هنگامی که بسته قرص خالی شد، از روز بعد بسته جدید را شروع کنید و منتظر خونریزی نباشید. بسته قرص بعدی را در همان روزی از هفته شروع کنید که بسته قرص قبلی را شروع کرده‌اید.

در صورتی که هر گونه تردیدی دارید، با ماما یا پزشک خود صحبت کنید.

این محصول، قرص Vinelle است

یک قرص ضد بارداری است که در صورت استفاده صحیح، از باردار شدن شما جلوگیری می‌کند. Vinelle حاوی مقادیر اندکی هورمون جنسی زنانه، پروژستین دزوژسترول، Vinelle می‌باشد. بنابراین Vinelle یک قرص ضد بارداری " فقط حاوی پروژستین" نامیده می‌شود. برخلاف قرص‌های ضد بارداری ترکیبی، Vinelle حاوی استروژن نمی‌باشد.

به صورت زیر از بارداری جلوگیری می‌کند:

- تخمک گذاری انجام نمی‌شود.
- آندومتر نازک باقی می‌ماند و با خون پر نمی‌شود، این موضوع به معنای این است که تخمک قادر به اتصال نیست.
- ترشحات دهانه رحم غلیظ شده و لایه ضخیمی ایجاد می‌کند که نفوذ اسپرم به داخل تخمک را مشکل می‌کند.

قبل از استفاده از Vinelle

- بروشور موجود در بسته‌بندی را به دقت مطالعه کنید.
- در صورتی که هر گونه سوالی دارید، با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید.

چرخه قاعده‌گی طبیعی شما

به منظور درک نحوه عملکرد Vinelle، بسیار مهم است که از نحوه عملکرد چرخه طبیعی قاعده‌گی خود اطلاع داشته باشید. یکبار در ماه، یک عدد تخمک از یکی از تخدمان‌های شما آزاد می‌شود. آندومتر پر از خون شده و قوی‌تر می‌شود و با این کار آماده دریافت تخمک می‌شود تا در صورتی که تخمک بارور شد، مواد مغذی لازم برای رشد و تبدیل شدن به جنین را در اختیار تخمک قرار دهد. در صورتی که تخمک بارور نشود، پس از 14 روز همراه با آندومتر تازه تشکیل شده در رحم، از بدن خارج می‌شود. خونریزی حاصل از این فرایند، پریود نامیده می‌شود. پریود معمولی بین 3 تا 8 روز طول می‌کشد. تمام چرخه قاعده‌گی، از شروع خونریزی تا خونریزی بعدی معمولاً 28 روز است، اما در زنان مختلف، از 21 تا 35 روز متفاوت است. در یک چرخه 28 روزه، تخمک گذاری می‌تواند بین روزهای 12 تا 16 اتفاق بیفتد.

توجه:

قرص‌های ضد بارداری، محافظتی در برابر بیماری‌های آمیزشی ایجاد نمی‌کنند، بنابراین اگر قصد رابطه جنسی با شریک جدیدی دارید، باید از کاندوم به عنوان شیوه محافظتی اضافی استفاده کنید.



بسته‌بندی قرص Vinelle حاوی 3 یا 6 بسته قرص است که هر یک داری 28 قرص می‌باشد. روزهای هفته بر روی هر بسته قرص چاپ شده است.

چه عوارض جانبی ممکن است برایم اتفاق بیفتد؟

عوارض جانبی شایعی که ممکن است رخ دهد عبارتند از خونریزی نامنظم، سردرد، آکنه یا حساسیت سینه، نوسانات خلقی، افسردگی و افزایش وزن نیز ممکن است رخ دهد. علاوه بر این، برخی عوارض جانبی وجود دارد که نادر اما جدی هستند. اگر هر گونه عارضه جانبی، به خصوص عوارض جانبی شدید یا طولانی مدت را تجربه کردید، یا اگر فکر من کنید سلامتی شما ممکن است به دلیل وینیل باشد، با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید.

در صورتی که هر یک از علایم زیر را مشاهده کردید، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:
خونریزی ناگهانی از دستگاه تناسلی، تورم یا درد ناگهانی در پاها، درد قفسه سینه یا مشکل در تنفس، درد ناگهانی یا شدید در قسمت شکم یا زیر شکم، احساس وجود توده در سینه یا مشکوک شدن به بارداری.

در صورتی که هر گونه سؤال یا تردیدی دارید، با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، بروشور اطلاعاتی برای بیمار را که در ستهبندی موجود است، مطالعه کنید.

در صورتی که مصرف قرص‌های ضد بارداری خود را متوقف کرده‌اید و من خواهید باردار شوید مصرف فولیک اسید را شروع کنید

فولیک اسید برای تقسیم سلولی طبیعی و رشد مغز و سیستم عصبی جنین لازم است. مصرف ناکافی فولیک اسید می‌تواند منجر به افزایش خطر تولد کودک با ضایعه بیرون‌زدگی نخاع شود. سازمان ملی غذا و سازمان ملی بهداشت و رفاه سوئد توصیه می‌کنند روزانه 400 میکرو گرم فولیک اسید را به عنوان مکمل مصرف کنید. به منظور اثرباری بهتر، توصیه می‌شود مصرف فولیک اسید را حدوداً یک ماه قبل از لقاح شروع کنید.

Natalben Gravid یک قرص مغذی است که به طور خاص برای زنانی که باردار هستند یا قصد باردار شدن دارند، طراحی شده است. Natalben Gravid حاوی اسید فولیک فعال است که تمام زنان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، همچنین آهن، ید، ویتامین D، امگا-3 و 14 ماده مغذی دیگر که برای بارداری مفید هستند، با دقت انتخاب شده و به آن اضافه شده‌اند. مکمل‌های غذایی جایگزین رژیم غذایی سالم نیستند بلکه باید با یک رژیم غذایی متنوع و متعادل و همچنین سبک زندگی سالم ترکیب شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مامای خود صحبت کرده یا به سایت زیر مراجعه نمایید

www.natalben.se

اگر مصرف قرص را فراموش کنم، باید چه کار کنم؟

کمتر از 12 ساعت تأخیر: به محض اینکه به یاد آوردید، قرص را که فراموش کردید اید مصرف کنید و قرص بعدی را در همان زمان عادی مصرف کنید. در این صورت در برابر بارداری محافظت نشود.

بیش از 12 ساعت تأخیر: اگر بیش از 12 ساعت در مصرف قرص تأخیر داشته‌اید، یعنی بیش از 36 ساعت از زمان مصرف قرص قبلی گذشته است، ممکن است دیگر در برابر بارداری محافظت نشود. به محض اینکه به یاد آوردید، قرص را مصرف کنید و قرص بعدی را در همان زمان عادی مصرف کنید. به صورت عادی به مصرف قرص‌ها ادامه دهید، اما به مدت 7 روز باید از یک روش پیشگیری اضافی مانند کاندوم استفاده کنید.

اگر در هفته اول یک یا چند قرص را فراموش کرده باشید و در هفته قبل از اینکه مصرف قرص را فراموش کرده باشید رابطه جنسی داشتید، ممکن است باردار باشید.

با ماما یا دکتر خود مشورت کنید.

اگر خونریزی نامنظم داشته باشم چه اتفاقی می‌افتد؟

خونریزی نامنظم، امری طبیعی است. این موضوع می‌تواند شامل لکه‌بینی باشد که نیازی به نوار بهداشتی ندارد یا نوعی از خونریزی باشد که مشابه قاعده‌گی سبک است و نیاز به محافظت دارد. همچنین ممکن است اصلًا خونریزی اتفاق نیفتد. خونریزی نامنظم نشانه کاهش محافظت در برابر بارداری توسط Vinelle نیست. به طور کلی، در این حالت نیاز به انجام هیچ کاری نیست، فقط مصرف Vinelle را ادامه دهید. اگر خونریزی‌های شما شدید و طولانی هستند با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید.

اگر استفراغ کردم یا دچار اسهال بودم باید چه کار کنم؟

از همان دستورالعمل قرص فراموش شده پیروی کنید. در صورتی که طی 3-4 ساعت پس از مصرف قرص استفراغ کنید یا اینکه دچار اسهال باشید، ممکن است بدن شما قادر به جذب صحیح هورمون نباشد. در این حالت، به مدت یک هفته باید از یک روش حفاظتی اضافی (مانند کاندوم) استفاده کنید. همچنین باید به صورت عادی به مصرف قرص‌ها ادامه دهید.

در صورتی که داروی دیگری مصرف می‌کنم، باید چه کار کنم؟

همیشه در صورت مصرف داروهای دیگر به ماما یا پزشک خود اطلاع رسانی کنید. مصرف وینیل در ترکیب با داروهای دیگر می‌تواند منجر به کاهش حفاظت شود. برخی از آنتی بیوتیک‌ها، دارو برای صرع و همچنین طب گیاهی سنت جان ورت نمونه هایی از این موضوع هستند.

اگر بخواهم باردار شوم باید چه کار کنم؟

در صورتی که می‌خواهید باردار شوید، مصرف Vinelle را متوقف کنید. در اغلب زنان، پس از توقف مصرف قرص‌های ضد بارداری، تخمک‌گذاری فوراً از سر گرفته می‌شود. اما بسته به میزان فعالیت تخدمانها، این فرایند ممکن است مدتی زمان ببرد. به یاد داشته باشید تمام زنانی که می‌خواهند باردار شوند باید از مصرف تباکو و الکل خودداری کرده و از مکمل‌های حاوی فولیک اسید مانند Natalben Gravid استفاده نمایند (اطلاعات بیشتر در صفحه بعد).

Vinelle (دزوژستريل 75 میکروگرم)، قرص، قرص ضد بارداری پروژسترلون. داروی نسخه‌ای تحت پوشش بیمه. مورد مصرف: ضد بارداری.

هشدارها و محدودیت‌ها: مطالعات نشان داده‌اند که بین استفاده از COC‌ها (های حاوی پروژسترلون) و افزایش بروز ترومیوآمبولی وریدی (ترومیووز وریدی عمیق و آمبولی ریوی) وجود دارد. اهمیت بالینی این یافته در زمان مصرف دزوژستريل به عنوان یک قرص ضد بارداری ناشناخته است، اما در صورت ترومیوز درمان با وینیل باید قطع شود.

عوارض جانبی: سردرد، تغییرات خلقی، افسردگی، کاهش میل جنسی، حالت تهوع، آکنه، درد سینه، خونریزی نامنظم، عدم خونریزی و افزایش وزن. خلاصه محصول به روزرسانی شده در 29 ژانویه 2021. برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت‌ها، به وبسایت www.fass.se مراجعه کنید.